Spé Maths Première	<u>Corrigé du devoir commun de mathématiques n°1 :</u>	Fait le mardi 03/10/2023
--------------------	---	-----------------------------

Exercice 1 : (3,5 pts)

1) a) Comme f est d'abord croissante, puis décroissante (d'après le tableau de variation), alors :

$$\underline{a < 0}$$

b) On sait que $f(1) = 0$, c'est-à-dire : 1 est une racine de f .

Or, d'après le tableau de variation de f , la droite d'équation $x = -3$ est axe de symétrie de la parabole représentant f . D'où f admet une autre racine.

$$\text{Par conséquent : } \underline{\Delta > 0}$$

OU (autre justification) :

(On sait que 1 est racine de f (car $f(1) = 0$) et si $\Delta = 0$, alors la seule racine est $\alpha = -3$ ici.

$$\text{Or, } \alpha \neq 1.$$

$$\text{Donc, } \underline{\Delta > 0}$$

c) Comme $\Delta > 0$, f admet bien deux racines. On sait déjà que 1 est racine de f .

La droite d'équation $x = -3$ étant axe de symétrie de la parabole représentant f , il y a quatre unités pour aller de -3 à 1, il faut donc soustraire quatre unités pour aller de -3 à la deuxième racine.

$$\text{Donc : } \underline{x_2 = -3 - 4 = -7}$$

2)a) On sait que $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ (forme canonique de f)

D'après le tableau de variation : $\alpha = -3$ et $\beta = 5$

$$\text{D'où : } f(x) = a(x + 3)^2 + 5$$

$$\text{Or, } f(1) = 0, \text{ d'où : } a(1+3)^2 + 5 = 0 \Leftrightarrow 16a + 5 = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{5}{16}$$

Par conséquent : la forme canonique de f est donnée par : $\underline{f(x) = -\frac{5}{16}(x + 3)^2 + 5}$

Exercice 2 : (5,5 pts)

1) On a $f(x) = x^2 - 3x + 2$, avec : $\begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = 2 \end{cases}$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0$, d'où f admet deux racines réelles distinctes.

2) Soit $f(x) = -3x^2 + 6x + 9$, avec : $\begin{cases} a = -3 \\ b = 6 \\ c = 9 \end{cases}$

$\Delta = b^2 - 4ac = 6^2 - 4 \times (-3) \times 9 = 36 + 108 = 144 > 0$: d'où le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 + 12}{-6} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 - 12}{-6} = 3$$

Le trinôme f est du signe de a à l'extérieur de ses racines. Or, $a < 0$

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
Signe de f(x)	-	0	+	0	-

Par conséquent :

$$f(x) \geq 0, \text{ pour } x \in [-1 ; 3]$$

$$f(x) < 0, \text{ pour } x \in]-\infty ; -1[\cup]3 ; +\infty[$$

3) a) $8x^2 - 5x - 2 = (2x + 3)(x - 1)$

$$\Leftrightarrow 8x^2 - 5x - 2 = 2x^2 - 2x + 3x - 3$$

$$\Leftrightarrow 6x^2 - 6x + 1 = 0 : \begin{cases} a = 6 \\ b = -6 \\ c = 1 \end{cases}$$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 6 \times 1 = 36 - 24 = 12 > 0$: d'où l'équation admet deux solutions réelles distinctes

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{6 + \sqrt{12}}{12} = \frac{6 + 2\sqrt{3}}{12} = \frac{3 + \sqrt{3}}{6} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{6 - \sqrt{12}}{12} = \frac{3 - \sqrt{3}}{6}$$

Donc :

$$S = \left\{ \frac{3 + \sqrt{3}}{6}; \frac{3 - \sqrt{3}}{6} \right\}$$

b) Valeur interdite :

$x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 4$. On va donc résoudre l'équation sur $\mathbb{R} \setminus \{4\}$

$$\text{Or, } \frac{-2x^2 - 12x - 19}{x - 4} = 0 \Leftrightarrow -2x^2 - 12x - 19 = 0 \text{ avec : } \begin{cases} a = -2 \\ b = -12 \\ c = -19 \end{cases}$$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \times (-2) \times (-19) = 144 - 152 = -8 < 0$. D'où l'équation n'admet aucune racine réelle.

Donc : $S = \emptyset$

$$4) \quad -4x^2 + 20x - 25 \leq 0 \quad \text{avec : } \begin{cases} a = -4 \\ b = 20 \\ c = -25 \end{cases}$$

$\Delta = b^2 - 4ac = 20^2 - 4 \times (-4) \times (-25) = 400 - 400 = 0$. D'où le trinôme admet une seule racine réelle.

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-20}{-8} = \frac{5}{2}$$

Le trinôme est toujours du signe de a et il s'annule en $x = x_0$. Or, $a < 0$

Donc $S = \mathbb{R}$

Exercice 3 : (7 pts)

1) $f(x) = 2x^2 - 10x - 2x + 16$

$$= \underline{2x^2 - 12x + 16} \quad \text{avec : } \begin{cases} a = 2 \\ b = -12 \\ c = 16 \end{cases}$$

2) On a $S(\alpha; \beta)$ avec $\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{12}{4} = 3$ et $\beta = f(\alpha) = f(3) = 2 \times 9 - 12 \times 3 + 16 = -2$

Donc : **le point S a pour coordonnées : (3 ; -2)**

3) Comme $a > 0$, f possède un minimum sur $\mathbb{R}$

Il vaut **$\beta = -2$ et il est atteint en $x = \alpha = 3$**

4) Tableau de variation de f :

Comme $a > 0$, f est d'abord décroissante, puis croissante :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
Variations de f

5) Intersection avec l'axe des abscisses :

On doit résoudre $f(x) = 0$, c'est-à-dire : $2x^2 - 12x + 16 = 0$ avec : $\begin{cases} a = 2 \\ b = -12 \\ c = 16 \end{cases}$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \times 2 \times 16 = 144 - 128 = 16 > 0$, d'où l'équation admet deux solutions réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{12 + 4}{4} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{12 - 4}{4} = 2$$

La parabole représentant f possède deux points d'intersection avec l'axe des abscisses :

A(4 ; 0) et B(2 ; 0)

6) Intersection avec l'axe des ordonnées :

$f(0) = 16$. Le seul point d'intersection de la parabole représentant f avec l'axe des ordonnées a pour coordonnées : **(0 ; 16)**

7) $2x^2 - 14x + 20 = 0$ avec : $\begin{cases} a = 2 \\ b = -14 \\ c = 20 \end{cases}$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-14)^2 - 4 \times 2 \times 20 = 196 - 160 = 36 > 0$, d'où l'équation admet deux solutions réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{14 + 6}{4} = 5 \quad \text{et } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{14 - 6}{4} = 2$$

Donc **S = {5 ; 2}**

Les abscisses des éventuels points d'intersection de (C_f)

avec la droite d'équation : $y = 2x - 4$ sont solutions de l'équation :

$$2x^2 - 12x + 16 = 2x - 4$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 12x - 2x + 16 + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 14x + 20 = 0 \text{ il s'agit de l'équation précédente.}$$

Donc : Il y a deux points d'intersection de coordonnées respectives (5 ; f(5)) et (2 ; f(2))

$$\text{Or } f(5) = 2 \times 5^2 - 12 \times 5 + 16 = 6 \quad \text{et } f(2) = 2 \times 2^2 - 12 \times 2 + 16 = 0$$

Par conséquent : **les points d'intersection sont ceux de coordonnées (5 ; 6) et (2 ; 0)**

Exercice 4 : (4 pts)

$$1) a) -0,01(x - 28)^2 + 9,61 = -0,01(x^2 - 56x + 784) + 9,61$$

$$= -0,01x^2 + 0,56x - 7,84 + 9,61$$

$$= -0,01x^2 + 0,56x + 1,77$$

$$\text{Or, } f(x) = -0,01x^2 + 0,56x + 1,77, \text{ donc : } \mathbf{f(x) = -0,01(x - 28)^2 + 9,61}$$

$$b) -0,01(x + 3)(x - 59) = -0,01(x^2 - 59x + 3x - 177)$$

$$= -0,01x^2 + 0,56x + 1,77 = f(x)$$

$$\text{Donc : } \mathbf{f(x) = -0,01(x + 3)(x - 59)}$$

c) La forme 1 est la forme développée et réduite

La forme 2 est la forme canonique

La forme 3 est la forme factorisée

2)a) Avec la forme 1, pour $x = 0$, on trouve $f(0) = 1,77$.

Le lanceur mesure donc 1,77m

b) La pointe du javelot touche le sol quand $f(x) = 0$

C'est-à-dire : avec la forme 3, on obtient : $-0,01(x + 3)(x - 59) = 0$

$\Leftrightarrow x + 3 = 0$ ou $x - 59 = 0$

$\Leftrightarrow x = -3$ ou $x = 59$

Or $x \geq 0$, donc : **Le javelot touche le sol au bout de 59 m**

c) Avec la forme 2 , le maximum atteint par f est $9,61 = \beta$

La hauteur maximale atteinte par la pointe du javelot est 9,61m