Spé Maths Terminale (M Mangeard)	Cours : Fonctions trigonométriques <i>Rappels et compléments</i>	2020/2021
--	--	-----------

I) Fonction sinus :

1) Périodicité :

Soit $f(x) = \sin(x)$. f est définie et périodique de période 2π .

C'est-à-dire : pour tout x réel, $f(x + 2\pi) = f(x)$

Remarque importante : Pour étudier la fonction sin, il suffit donc de se placer sur un intervalle de longueur 2π (Par exemple : $[-\pi ; \pi]$)

2) Parité :

f est définie sur $]-\infty ; +\infty[$ (=domaine symétrique par rapport à l'origine)

De plus $f(-x) = \sin(-x) = -\sin(x)$, pour tout x réel.

f est donc une fonction impaire

La courbe de f présente donc une symétrie centrale de centre O

Remarque : Il suffit d'étudier la fonction sinus sur $[0 ; \pi]$

3) Continuité :

La fonction sinus est continue sur $\mathbb{R}$

4) Dérivabilité :

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et **$f'(x) = \cos(x)$**

5) Variations sur $[0 ; \pi]$:

Comme $f'(x) = \cos(x)$ et $\cos(x) \geq 0$, pour $x \in [0 ; \frac{\pi}{2}]$ et $\cos(x) < 0$, sur $] \frac{\pi}{2} ; \pi]$

Autrement dit : f est croissante sur $[0 ; \frac{\pi}{2}]$ et décroissante sur $] \frac{\pi}{2} ; \pi]$

6) Courbe représentative de sin sur $[-\pi ; \pi]$:

7) Limites :

La fonction sinus n'a pas de limite en $+\infty$ ou $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

Démonstration :

$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = \sin(0)$ car la fonction sin est continue en 0.

D'où : $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0$

Par quotient, on a donc une forme indéterminée du type : « 0/0 »

$$\text{Or, } \frac{\sin(x)}{x} = \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0}, \text{ d'où : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0} = \sin'(0) = \cos(0) = 1$$

II) Fonction cosinus :

1) Périodicité :

Soit $f(x) = \cos(x)$. f est définie et périodique de période 2π .

C'est-à-dire : pour tout x réel, $f(x + 2\pi) = f(x)$

Remarque importante : Pour étudier la fonction cos, il suffit donc de se placer sur un intervalle de longueur 2π (Par exemple : $[-\pi ; \pi]$)

2) Parité :

f est définie sur $]-\infty ; +\infty[$ (=domaine symétrique par rapport à l'origine)

De plus $f(-x) = \cos(-x) = \cos(x)$, pour tout x réel.

f est donc une fonction paire

La courbe de f présente donc une symétrie d'axe l'axe des ordonnées.

Remarque : Il suffit d'étudier la fonction cosinus sur $[0 ; \pi]$

3) Continuité :

La fonction cosinus est continue sur $\mathbb{R}$

4) Dérivabilité :

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et **$f'(x) = -\sin(x)$**

5) Variations sur $[0 ; \pi]$:

Sur $[0 ; \pi]$, $\sin(x) \geq 0$, d'où : $-\sin(x) \leq 0$

Donc : f est décroissante sur $[0 ; \pi]$

6) Courbe représentative de cos sur $[-\pi ; \pi]$:

7) Limites :

La fonction cosinus n'a pas de limite en $+\infty$ ou $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0$$

Démonstration :

Remarque :

Les deux sinusoides sont décalées de $\frac{\pi}{2}$ (on parle de décalage en quadrature) :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$

III) Equations et inéquations trigonométriques :

Pour les résolutions d'équations et d'inéquations trigonométriques, il est impératif de connaître les valeurs remarquables de cos et sin.

1) Equations :

Soit $a \in \mathbb{R}$, l'équation $\cos(x) = \cos(a)$ admet comme solutions les $x = a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, et les $x = -a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Soit $a \in \mathbb{R}$, l'équation $\sin(x) = \sin(a)$ admet comme solutions les $x = a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, et les $x = \pi - a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Exemples :

a) $\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0 ; 2\pi]$

$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et donc : $\cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ et $\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Or, $-\frac{5\pi}{6} \notin [0 ; 2\pi]$, $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi = \frac{7\pi}{6}$

Les solutions sur $[0 ; 2\pi]$ sont :

$$\underline{S} = \left\{ \frac{5\pi}{6} ; \frac{7\pi}{6} \right\}$$

b) Résoudre l'équation $\cos(3x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $\mathbb{R}$, puis sur $[0 ; 2\pi]$

- Tout d'abord, sur $\mathbb{R}$:

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$$

D'où : $3x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $3x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$

Donc : $x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$ ou $x = -\frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$, avec $k \in \mathbb{Z}$

(ATTENTION : Il faut aussi diviser le $2k\pi$ par 3)

Donc les solutions de l'équation sur $\mathbb{R}$ sont :

$$S = \left\{ \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} ; -\frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} \text{ avec } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

- Sur $[0 ; 2\pi]$:

Il faut déterminer toutes les solutions de cette équation situées dans $[0 ; 2\pi]$.

On peut raisonner par encadrements pour obtenir les différentes valeurs de k possibles :

On a : $0 \leq \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} \leq 2\pi$

$0 \leq -\frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} \leq 2\pi$

$$\begin{array}{l}
 -\frac{\pi}{18} \leq \frac{2k\pi}{3} \leq 2\pi - \frac{\pi}{18} = \frac{35\pi}{18} \\
 \text{D'où : } \frac{3}{2\pi} \times \left(-\frac{\pi}{18}\right) \leq k \leq \frac{35\pi}{18} \times \frac{3}{2\pi} \\
 -\frac{1}{12} \leq k \leq \frac{35}{12}, \text{ d'où } k = 0 ; 1 \text{ ou } 2 \\
 \text{D'où : } x = \frac{\pi}{18} ; \frac{13\pi}{18} ; \frac{25\pi}{18}
 \end{array}
 \quad \left| \quad
 \begin{array}{l}
 \frac{\pi}{18} \leq \frac{2k\pi}{3} \leq 2\pi + \frac{\pi}{18} = \frac{37\pi}{18} \\
 \text{D'où : } \frac{3}{2\pi} \times \left(\frac{\pi}{18}\right) \leq k \leq \frac{37\pi}{18} \times \frac{3}{2\pi} \\
 \frac{1}{12} \leq k \leq \frac{37}{12}, \text{ d'où } k = 1 ; 2 \text{ ou } 3 \\
 x = \frac{11\pi}{18} ; \frac{23\pi}{18} ; \frac{35\pi}{18}
 \end{array}$$

Donc, finalement :

$$S = \left\{ \frac{\pi}{18} ; \frac{13\pi}{18} ; \frac{25\pi}{18} ; \frac{11\pi}{18} ; \frac{23\pi}{18} ; \frac{35\pi}{18} \right\}$$

Vérification à la calculatrice :

La sinusoïde de f telle que $f(x) = \cos(3x)$ coupe la droite horizontale d'équation $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ six fois sur $[0 ; 2\pi]$: l'équation a donc six solutions sur $[0 ; 2\pi]$

c) Résoudre l'équation $\sin(2x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[-\pi ; \pi]$

On a : $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\left(\pi - \left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$

D'où :

$$2x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z} \quad \text{ou} \quad 2x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$x = -\frac{\pi}{8} + k\pi, \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{8} + k\pi, \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$-\pi \leq -\frac{\pi}{8} + k\pi \leq \pi$$

$$-\frac{7\pi}{8} \leq k\pi \leq \frac{9\pi}{8}$$

$$-\frac{7}{8} \leq k \leq \frac{9}{8}$$

D'où : $k = 0 ; 1$

$$x = -\frac{\pi}{8} ; \frac{7\pi}{8}$$

$$-\pi \leq \frac{5\pi}{8} + k\pi \leq \pi$$

$$-\frac{13\pi}{8} \leq k\pi \leq \frac{3\pi}{8}$$

$$-\frac{13}{8} \leq k \leq \frac{3}{8}$$

D'où : $k = -1 ; 0$

$$x = -\frac{3\pi}{8} ; \frac{5\pi}{8}$$

$$\text{Par conséquent : } S = \left\{ -\frac{\pi}{8} ; \frac{7\pi}{8} ; -\frac{3\pi}{8} ; \frac{5\pi}{8} \right\}$$

2) Inéquations :

Utiliser à chaque fois un schéma d'un cercle trigonométrique.

Exemples :

a) Résoudre l'inéquation suivante sur $[0 ; 2\pi]$: $\cos(x) \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$

On a $\cos(\frac{3\pi}{4}) = \cos(\frac{5\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Les solutions correspondent aux valeurs représentées en rouge sur le cercle trigonométrique ci-dessus.

ATTENTION : L'intervalle de résolution est $[0 ; 2\pi]$

Donc :

$$S = [0 ; \frac{3\pi}{4}] \cup [\frac{5\pi}{4} ; 2\pi]$$

b) Résoudre l'inéquation suivante sur $[-\pi ; \pi]$: $\sin(2x) < \frac{1}{2}$

On a $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2} = \sin(\frac{5\pi}{6})$

D'où $2x \in [-\pi ; \frac{\pi}{6}[\cup]\frac{5\pi}{6} ; \pi]$ et donc : $S = [-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{12}[\cup]\frac{5\pi}{12} ; \frac{\pi}{2}]$

IV) Fonctions cos(u(x)) et sin(u(x)), où u est une fonction :

Soit u, une fonction définie et dérivable sur $I \subset \mathbb{R}$.

Alors, $\cos(u(x))$ et $\sin(u(x))$ sont dérivables sur I et :

1) $(\cos(u))' = -u' \sin(u)$	2) $(\sin(u))' = u' \cos(u)$
-------------------------------	------------------------------

Exemples :

a) $f(x) = \cos(3x + \frac{\pi}{6})$

On pose $u(x) = 3x + \frac{\pi}{6}$

u est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $u'(x) = 3$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(\cos(u))' = -u' \sin(u)$

$$D'où : f'(x) = -3 \sin(3x + \frac{\pi}{6})$$

b) $g(x) = \cos(2x) \sin(4x)$

On pose $u(x) = \cos(2x)$ et $v(x) = \sin(4x)$

u et v sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

On pose $a(x) = 2x$ et $b(x) = 4x$

$a'(x) = 2$ et $b'(x) = 4$

On a : $u'(x) = -2 \sin(2x)$ et $v'(x) = 4 \cos(4x)$

De plus, $(uv)' = u'v + uv'$

$$D'où : g'(x) = -2 \sin(2x) \sin(4x) + 4 \cos(4x) \cos(2x)$$

Exemple d'étude d'une fonction trigonométrique : la fonction tangente

Soit $f(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

a) Tout d'abord : $\cos(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

Donc f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ avec } k \in \mathbb{Z}\}$

b) *Montrons que f est π -périodique :*

Soit $x \in \mathbb{R}$, $f(x + \pi) = \frac{\sin(x+\pi)}{\cos(x+\pi)} = \frac{-\sin(x)}{-\cos(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = f(x)$, donc **f est π -périodique**

On peut donc étudier f sur un intervalle de longueur π . On va se placer sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$

c) *Etude de la parité de f :*

L'intervalle $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ est symétrique par rapport à l'origine.

De plus, soit $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\sin(x)}{\cos(x)}$ (car $\sin(-x) = -\sin(x)$ et $\cos(-x) = \cos(x)$)
 $= -f(x)$

Donc : **f est impaire (=sa courbe représentative présente une symétrie de centre O)**

On va donc pouvoir étudier f sur $[0 ; \frac{\pi}{2}[$

d) Variations de f sur $[0 ; \frac{\pi}{2}[$:

f est dérivable sur $[0 ; \frac{\pi}{2}[$, car un quotient est dérivable partout où il est défini.

On pose $u(x) = \sin(x)$ et $v(x) = \cos(x)$

On a : $u'(x) = \cos(x)$ et $v'(x) = -\sin(x)$

Or, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

D'où : $f'(x) = \frac{\cos(x)\cos(x) + \sin(x)\sin(x)}{(\cos(x))^2} = \frac{(\cos(x))^2 + (\sin(x))^2}{(\cos(x))^2} = \frac{1}{(\cos(x))^2} (= 1 + (\tan(x))^2)$

(car $(\cos(x))^2 + (\sin(x))^2 = 1$)

Or, $(\cos(x))^2 > 0$, pour tout $x \in [0 ; \frac{\pi}{2}[$, c'est-à-dire : **f strictement croissante sur $[0 ; \frac{\pi}{2}[$.**

On a : $f(0) = \frac{\sin(0)}{\cos(0)} = 0/1 = 0$

$\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x < \frac{\pi}{2}}} f(x) = ?$

On a : $\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x < \frac{\pi}{2}}} \sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$ (car sin est continue en $\frac{\pi}{2}$)

$= 1$

D'autre part : $\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x < \frac{\pi}{2}}} \cos(x) = 0^+$, d'où, par quotient, $\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x < \frac{\pi}{2}}} f(x) = +\infty$

(IG : La courbe de f admet la droite d'équation $x = \frac{\pi}{2}$ comme asymptote verticale)

Tableau de variations de f sur $[0 ; \frac{\pi}{2}[$:

x	0	$\frac{\pi}{2}$
Signe de f'(x)	+	
Variations de f		

Par symétrie de centre O, la courbe de f admet aussi la droite d'équation $x = -\frac{\pi}{2}$ comme asymptote verticale.

Courbe représentative de la fonction tan sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$:

$$x = -\frac{\pi}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{2}$$