Spé Maths Terminale (M Mangeard)	Géométrie dans l'espace (2) : <i>Orthogonalité dans l'espace / Equations cartésiennes de plans</i>	Année scolaire 2021/2022
--	--	-----------------------------

1) Produit scalaire dans l'espace :

On va étendre le produit scalaire du plan, ainsi que ses propriétés à l'espace.

(Pour le produit scalaire dans le plan, voir le cours de Spé Première à ce sujet)

1) Définition :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$, deux vecteurs de l'espace. On considère trois points A, B et C tels que :

$\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Il existe au moins un plan (P) contenant A, B et C.

Le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ calculé dans (P)

2) Propriétés :

a) Expression avec cos :

$\vec{u} \cdot \vec{v} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$
--	---

b) Si H est le projeté orthogonal du point C sur (AB) :

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = - AB \times AH$

c) Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$, trois vecteurs de l'espace. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \vec{v} \cdot \vec{u} \\ \vec{u} \cdot \lambda \vec{v} &= \lambda \vec{u} \cdot \vec{v} \\ \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) &= \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \end{aligned}$$

d) Carré scalaire et norme :

Soit $\vec{u}$, un vecteur de l'espace. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2$ (=carré scalaire du vecteur $\vec{u}$)

La norme du vecteur $\vec{u}$ est notée $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u}^2}$

e) Identités remarquables et normes :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

Démonstration de la première formule : (c'est la même que dans le plan)

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} \\ &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

f) Formules de polarisation :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2]$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2]$$

Démonstrations (faciles)

Remarque : On peut aussi démontrer la relation suivante :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2]$$

g) Orthogonalité de deux vecteurs :

$$\vec{u} \text{ orthogonal à } \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Remarque : Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur de l'espace.

II) Bases orthonormées . Repères orthonormés :

1) Bases et repères :

Une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace est dite **orthonormée** si ses vecteurs sont et si :

.....

Soit O un point de l'espace.

$(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est **un repère orthonormé** de l'espace si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est

2) Expression analytique du produit scalaire :

Soient $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$, deux vecteurs dans un repère orthonormé de l'espace.

Alors : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \dots\dots\dots$

3) Norme et distance dans un repère orthonormé :

Soit $\vec{u}(x; y; z)$ dans un repère orthonormé du plan.

Alors : $\|\vec{u}\| = \dots\dots\dots$

Soient $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$ dans un repère orthonormé de l'espace.

Alors : $AB = \dots\dots\dots$

Exemple : Equation cartésienne d'une sphère

Soit $\Omega(a; b; c)$ un point de l'espace.

Une équation cartésienne de la sphère de centre Ω et de rayon R (avec $R \geq 0$) est donnée par :

$\dots\dots\dots$

En effet :

La sphère de centre Ω et de rayon R est l'ensemble des points $M(x; y; z)$ de l'espace tels que :

Application : Montrer que l'équation suivante est une équation cartésienne d'une sphère dont on donnera les éléments caractéristiques :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 10z + 36 = 0 \text{ (E)}$$

III) Orthogonalité dans l'espace :

1) Orthogonalité de deux droites :

a) Définition :

Deux droites de l'espace sont dites orthogonales si leurs parallèles respectives passant par un même point sont

ATTENTION : Deux droites orthogonales de l'espace ne sont pas obligatoirement

b) Propriété :

Soient (d) et (d') , deux droites de l'espace. On considère les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{u}'$, vecteurs directeurs respectifs des droites (d) et (d') .

(d) est orthogonale à (d') $\Leftrightarrow$

2) Orthogonalité d'une droite et d'un plan :

a) Définition :

Soient (d) une droite de l'espace et (P) un plan.

(d) est orthogonale à (P) si (d)

b) Propriété :

(d) est orthogonale à (P) si (d)

(d_1) et (d_2) sont deux droites sécantes du plan (P)

(d) est à la fois orthogonale à (d_1) et à (d_2)

Donc : **(d) est orthogonale au plan (P)**

IV) Projection orthogonale dans l'espace :

1) Projection orthogonale d'un point sur une droite :

a) Définition :

Le projeté orthogonal d'un point M sur une droite (d) est le point H , point d'intersection du plan orthogonal à la droite (d) passant par M avec la droite (d) .

Remarque : Si $M \in (d)$, son projeté orthogonal sur (d) est lui-même.

b) Propriété :

H est le point de (d) le plus proche de M.

Démonstration :

Soient K et L, deux points situés sur (d) distincts de H

MHL est un triangle rectangle en H, d'où $[ML]$ est son hypoténuse.

D'où : $ML > MH$

Même chose dans le triangle MHK, rectangle en H

Définition : La longueur MH est la distance entre M et la droite (d) .

2) Projection orthogonale d'un point sur un plan :

a) Définition :

Le projeté orthogonal d'un point M sur un plan (P) est le point H, point d'intersection du plan (P) avec la droite orthogonale au plan (P) passant par le point M.

b) Propriété :

Le point H est le point du plan (P) le plus proche de M

On appelle distance du point M au plan (P) la longueur MH

V) Equations cartésiennes de plans :

1) Vecteur normal à un plan :

a) Définition :

Un vecteur $\vec{n}$ est dit normal au plan (P) si

b) Propriété :

Soit (P) un plan de l'espace. A un point de (P) et $\vec{n}$ un vecteur normal à (P).

L'ensemble des points M de l'espace tels que :

2) Equations cartésiennes :

Dans un repère orthonormé, on considère un plan (P).

$M(x ; y ; z) \in (P) \Leftrightarrow$ il existe quatre nombres a, b, c et d, non tous nuls tels que :

Cette dernière égalité est appelée une équation cartésienne du plan (P)

Ce plan (P) admet le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ comme vecteur normal.

En effet : $A(x_A ; y_A ; z_A) \in (P) \Leftrightarrow ax_A + by_A + cz_A + d = 0$ (1)

De même : $M(x ; y ; z) \in (P) \Leftrightarrow ax + by + cz + d = 0$ (2)

En faisant (2) – (1) : $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$

Or, $\vec{AM} \cdot \vec{n} = a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A)$

De plus, l'ensemble des points M tels que $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$ est le plan (P)

Donc : (P) est bien un plan de l'espace admettant $\vec{n}$ comme vecteur normal.

Exemple d'application :

Soit (P) un plan de l'espace admettant le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ comme vecteur normal et passant par le point A(6 ; -2 ; 1)

Déterminer une équation cartésienne du plan (P).

Méthode 1 :

Méthode 2 :