

EXERCICE 1 : (4 points)

Commun à tous les candidats

Les deux questions de cet exercice sont indépendantes.

1) On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 1 \text{ et, pour tout nombre entier naturel } n, u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4.$$

On pose, pour tout nombre entier naturel n , $v_n = u_n - 6$.

a) Pour tout nombre entier naturel n , calculer v_{n+1} en fonction de v_n .

Quelle est la nature de la suite (v_n) ?

b) Démontrer que pour tout nombre entier naturel n , $u_n = -5\left(\frac{1}{3}\right)^n + 6$.

c) Étudier la convergence de la suite (u_n) .

2) On considère la suite (w_n) dont les termes vérifient, pour tout nombre entier $n \geq 1$:

$$n w_n = (n+1) w_{n-1} + 1 \text{ et } w_0 = 1.$$

Le tableau suivant donne les dix premiers termes de cette suite.

w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_7	w_8	w_9
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19

a) Détailler le calcul permettant d'obtenir w_{10} .

b) Dans cette question toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

Donner la nature de la suite (w_n) . Calculer w_{2009} .

EXERCICE 2 : (6 points)

Commun à tous les candidats

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $f(x) = \ln(1 + xe^{-x})$.

On note f' la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

On note \mathcal{C} la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. La courbe \mathcal{C} est représentée en annexe 1 (à rendre avec la copie).

PARTIE I

1) Justifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

2) Justifier que pour tout nombre réel positif x , le signe de $f'(x)$ est celui de $1 - x$.

3) Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

PARTIE II

Soit λ un nombre réel strictement positif. On pose $A(\lambda) = \int_0^\lambda f(x) dx$.

On se propose de majorer $A(\lambda)$ à l'aide de deux méthodes différentes.

1) **Première méthode.**

a) Représenter, sur l'annexe jointe (à rendre avec la copie), la partie du plan dont l'aire en unité d'aire, est égale à $A(\lambda)$.

b) Justifier que pour tout nombre réel λ strictement positif, $A(\lambda) \leq \lambda \times f(1)$.

2) **Deuxième méthode.**

a) Calculer à l'aide d'une intégration par parties $\int_0^\lambda xe^{-x} dx$ en fonction de λ .

b) On admet que pour tout nombre réel positif u , $\ln(1 + u) \leq u$.

Démontrer alors que, pour tout nombre réel λ strictement positif, $A(\lambda) \leq -\lambda e^{-\lambda} - e^{-\lambda} + 1$.

3) **Application numérique.**

Avec chacune des deux méthodes, trouver un majorant de $A(5)$, arrondi au centième.

Quelle méthode donne le meilleur majorant dans le cas où $\lambda = 5$?

EXERCICE 3 : (5 points)

Candidats : Commun à tous les candidats de spécialité

I Cette question est une restitution organisée de connaissances.

On rappelle que si n et p sont deux nombres entiers naturels tels que $p \leq n$ alors $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

Démontrer que pour tout nombre entier naturel n et pour tout nombre entier naturel p tels que

$$1 \leq p < n \text{ on a : } \binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}.$$

II Un sac contient 10 jetons indiscernables au toucher :

7 jetons blancs numérotés de 1 à 7 et 3 jetons noirs numérotés de 1 à 3.

On tire simultanément deux jetons de ce sac.

1) a) On note A l'événement «obtenir deux jetons blancs».

Démontrer que la probabilité de l'événement A est égale à $\frac{7}{15}$.

b) On note B l'événement «obtenir deux jetons portant des numéros impairs».

Calculer la probabilité de B.

c) Les événements A et B sont-ils indépendants ?

2) Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de jetons blancs obtenus lors de ce tirage simultané.

a) Déterminer la loi de probabilité de X .

b) Calculer l'espérance mathématique de X .

EXERCICE 4 : (5 points)

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on associe à tout point M d'affixe z non nulle, le point M' milieu du segment $[MM_1]$, où M_1 est le point d'affixe $\frac{1}{z}$.

Le point M' est appelé l'image du point M .


- 1) a) Montrer que les distances OM et OM_1 vérifient la relation $OM \times OM_1 = 1$ et que les angles $(\vec{u}; \overrightarrow{OM_1})$ et $(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$ vérifient l'égalité des mesures suivantes $(\vec{u}; \overrightarrow{OM_1}) = -(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$ à 2π près.
b) Sur la figure donnée en annexe 2 (à rendre avec la copie) le point A appartient au cercle de centre O et de rayon 2.
Construire le point A' image du point A . (On laissera apparents les traits de construction).
- 2) a) Justifier que pour tout nombre complexe z non nul, le point M' a pour affixe $z' = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$.
b) Soient B et C les points d'affixes respectives $2i$ et $-2i$. Calculer les affixes des points B' et C' images respectives des points B et C .
c) Placer les points B, C, B' et C' sur la figure donnée en annexe 2 (à rendre avec la copie).
- 3) Déterminer l'ensemble des points M tels que $M' = M$.
- 4) *Dans cette question, toute trace de recherche même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.*

Montrer que si le point M appartient au cercle de centre O et de rayon 1 alors son image M' appartient au segment $[KL]$ où K et L sont les points d'affixes respectives -1 et 1 .

ANNEXE 1
Exercice 2

Candidats n'ayant pas de spécialité (À rendre avec la copie)

(À rendre avec la copie)




ANNEXE 2

Exercice 4

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

(À rendre avec la copie)



Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. Le candidat doit traiter tous les exercices. Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le texte pour aborder les questions suivantes, à condition de l'indiquer clairement sur la copie. Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée. Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Le sujet comporte deux annexes à rendre avec la copie.

Avant de commencer, le candidat s'assure que le sujet comporte bien 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.